

ESCA RODENTICIDA

# BRODIMAX

FORTE PASTA



“ *I buoni ingredienti sono alla base di ogni ricetta di successo.* ”

ESCA RODENTICIDA IN PASTA PRONTA ALL'USO

## Brodimax

**Forte Pasta**  
MAYER



contiene amaricante

MADE IN ITALY



PER UN MONDO MIGLIORE E PIÙ PULITO



**Brodimax**  
**Forte Pasta**  
MAYER

S M L XL

**24**  
ACTION TIME (in ore)

*Rispetto per l'ambiente*



ESCA RODENTICIDA

# BRODIMAX

## FORTE PASTA



### CARATTERISTICHE

**Brodimax Forte Pasta** è un'esca in bocconcini di pasta fresca confezionata in singole bustine in carta alimentare, monodose, pronte all'uso a base di Brodifacoum.

Formulata con ingredienti di elevata appetibilità.

L'elevato potere del principio attivo impiegato la rende particolarmente indicata nella lotta ai ratti più resistenti.

**Brodimax Forte Pasta** contiene Denatonium Benzoato, una sostanza amaricante volta a prevenire il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non target. Il prodotto esplica la sua azione per ingestione provocando la morte dei roditori per emorragia interna nel giro di **24 ore**.

Il prodotto è disponibile in bustine **aromatizzate ai cereali tostati o alla gianduia**.

### DOVE SI USA

Può essere usato all'interno ed intorno ad abitazioni, cantine, garage ripostigli e giardini.

### ISTRUZIONI MODALITÀ D'USO E DOSI DI IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. Le confezioni interne predosate devono essere manipolate con le dovute precauzioni ed il contenuto posto nell'apposito contenitore secondo il dosaggio sotto riportato. Le esche devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori appropriati a prova di manomissione e debitamente marcati, disponibili in commercio, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i loro percorsi e nei posti di maggior presenza.

#### Le dosi consigliate sono:

Topolino domestico: 40 g di esca x 100 mq

Ratto grigio: 60-100 g di esca x 100 mq

Ratto nero: 60-100 g di esca x 100 mq

#### Segnalare adeguatamente la zona interessata al trattamento.

Controllare settimanalmente le esche nei contenitori, sostituire quelle consumate.

Effettuare operazioni di controllo ad intervalli frequenti per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo le norme previste. Non gettare le carcasse nei rifiuti o nelle discariche. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. Non riutilizzare la confezione erosa e non disperderla nell'ambiente ma eliminarla in conformità alle norme vigenti. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento togliere i contenitori ed eliminare le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere attentamente le istruzioni contenute in etichetta.

### AVVERTENZE

I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante.

Non riutilizzare la confezione vuota e non disperderla nell'ambiente ma eliminarla in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un Centro Antiveneni. Il prodotto può essere pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali non bersaglio. In caso di ingestione accertata occorre indurre il vomito. Rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostrandogli il contenitore o l'etichetta.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Riferirsi alle avvertenze riportate in etichetta.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**MECCANISMO D'AZIONE:** la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti.

**SINTOMI:** avvelenamento grave a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto è in grado di provocare inibizione della vitamina K, causando emorragie cutanee e delle mucose e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica.

**TERAPIA:** in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se risultasse ridotta somministrare vitamina K. **Controllare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveneni.**

**CONTROINDICAZIONI:** anticoagulanti.



VALIDITÀ 24 MESI



#### 100g di prodotto contengono

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)	0,005 g
Denatonium Benzoate	0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti	q.b. a 100 g

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) IT/2014/00189/AUT

Codice prodotto **BDP0200**



8 0114 12 003062

Codice prodotto **BDP0500**



8 0114 12 003079

Codice prodotto **BDP0200**



8 0114 12 003468

Codice prodotto **BDP0500**



8 0114 12 003475

MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND SRL

Via Brigata Marche, 129 - 31030 CARBONERA (TV) - ITALY

Tel. +39 0422 445 455 - Fax +39 0422 398 244

question@mayerbraun.com - www.mayerbraun.com



MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND